

Терапия болевого синдрома у онкологических больных

Рак в поздней стадии, как правило, сопровождается болью. В связи с этим снятие и лечение боли является неотъемлемой частью лечения онкологического заболевания. Это сигнал к тому, что пациенту требуется помощь специалиста, который назначит нужные обезболивающие препараты, и поможет справиться с болью. Определить выраженность боли можно по специальной шкале, оценив интенсивность боли от 0 до 10 баллов.

Лечение болевого синдрома основано на принципах Всемирной организации здравоохранения:

- необходимо ежедневно в одно и то же время принимать анальгетики - обезболивающие препараты, чтобы избежать усиления боли;
- анальгетики назначаются врачом по принципу от высоких доз слабого анальгетика к низким дозам сильного анальгетика;
- при выписке препаратов врачом оценивается индивидуальная реакция больного на препарат;
- необходимо с вниманием относиться к своему самочувствию при приеме анальгетиков и незамедлительно сообщать врачу о появлении побочных реакций организма на препарат.

Обезболивание пациентов с применением наркотических средств в амбулаторных условиях осуществляется по месту нахождения (фактического проживания) пациента.

Назначение наркотических средств осуществляется медицинским работником единолично согласно приказу Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков их учета и хранения».

С целью получения обезболивающего препарата необходимо обратиться к врачу терапевту участковому по месту проживания (фактического нахождения) пациента, врач осматривает пациента и выписывает рецепт на специальном бланке, затем родственники пациента могут получить лекарственный препарат в аптеке.

Если у Вас возникли трудности с назначением или получением обезболивающего, обратитесь по телефону 8 (34130)5-32-04 в будние дни в рабочее время с 08:30 до 16:30.